


Prevenzione e lotta alle zanzare nella pianura Bolognese



Comuni di Crevalcore, San Giovanni in P., Sala Bolognese, Anzola Emilia, Calderara di Reno.

Monitoraggio zanzare AUTOCTONE

SETTIMANA N° 30



A Palata Pepoli le catture sono sottostimate a causa di un guasto alla trappola



SUSTENIA S.r.l.

Via Marzocchi, 16 San Giovanni in Persiceto


Tel. 051.6871051; Email: info@sustenia.it




Prevenzione e lotta alle zanzare nella pianura Bolognese

Comuni di Crevalcore, San Giovanni in P., Sala Bolognese, Anzola Emilia, Calderara di Reno.

Monitoraggio zanzare AUTOCTONE



SCALA DI DISAGIO



Legenda

- Centri abitati
- aree umide
- Area di progetto: Bologna ovest Reno



SUSTENIA S.r.l.

Via Marzocchi, 16 San Giovanni in Persiceto

Tel. 051.6871051; Email: info@sustenia.it

Il valore di disagio è ottenuto sulla base del numero delle zanzare catturate con le trappole ad anidride carbonica e considerando l'aggressività delle singole specie raggruppate in tre categorie: Gruppo a disagio **alto** (*Aedes caspius*, *Aedes vexans*), **medio** (*Culex modestus*, *Anopheles spp.*), **basso** (*Culex pipiens*; *Culiseta spp.*).

Prevenzione e lotta alle zanzare nella pianura Bolognese


Comuni di Crevalcore, San Giovanni in P., Sala Bolognese, Anzola Emilia, Calderara di Reno.

Parliamo di Pappataci.....

La stazione di Sala Bolognese ha registrato 32 esemplari di Pappataci. I Pappataci o Flebotomi appartengono all'ordine dei Ditteri, sottordine Nematoceri, famiglia Psychodidae, sottofamiglia Phlebotominae. Sono insetti piccoli, 2-3 mm di media, di colore nocciola chiaro e sono ricoperti da una fitta peluria. Come le zanzare sono insetti ematofagi, ovvero hanno bisogno del pasto di sangue per maturare le uova. Hanno abitudini crepuscolari e notturne. Le femmine attaccano senza far rumore, da qui il nome "Pappa e tace". E le loro punture sono fastidiose. Si contano nel mondo oltre 800 specie di Flebotomi; in Italia sono presenti solo 8 specie di cui 4 vettori della *Leishmaniosi*, malattia provocata da un protozoo, *Leishmania infantum*, che colpisce principalmente il cane e raramente l'uomo. Vettori principali sono le specie: *P. Perniciosus*, *P. Perfiliewi*, e *P. papatasi*. I Phlebotomi sono cattivi volatori: compiono brevi "salti" che gli permettono una dispersione di 100-200 metri, a 2-3 metri dal suolo. In condizioni di vento favorevole possono spostarsi fino a 2 km. Fattori che limitano ulteriormente la loro diffusione sono il vento e le temperature al di sotto dei 20° C. Normalmente si concentrano nei luoghi dove possono nutrirsi e riprodursi. Le larve sviluppano in ambienti umidi sotto la vegetazione morta (foglie e altri residui organici); gli adulti nelle ore di inattività si riparano nei luoghi più disparati: nelle crepe del terreno e dei muri, nelle tane di roditori o altri animali, sotto il fogliame fitto. In casa possono ripararsi nelle cantine, nelle lettiere di cani e gatti, dietro i mobili, e nelle camere da letto sotto i materassi.



La presenza molesta di Zanzara Tigre è stata registrata nella stazione di Decima, Sala Bolognese, e Anzola Emilia.



INFORMAZIONI SULLA DISINFESTAZIONE

ZANZARA TIGRE

Disinfestazione caditoie pubbliche

Chiuso il 3° turno a San Giovanni in P.to e Crevalcore (marcatura tombini colore arancione). In corso il 3° turno a Calderara di Reno (marcatura tombini colore arancione)

ZANZARE AUTOCTONE

Trattamenti larvicidi nei focolai lineari (fossi e canali)

settimana dall' 1 al 6 agosto

mercoledì: San Giovanni in Persiceto

Giovedì: Sala Bolognese, Calderara di Reno, Crevalcore

Venerdì: Anzola Emilia

SUSTENIA S.r.l.

Via Marzocchi, 16 San Giovanni in Persiceto

Tel. 051.6871051; Email:info@sustenia.it

