




Prevenzione e lotta alle zanzare nella pianura Bolognese

Comuni di Crevalcore, San Giovanni in P., Sala Bolognese, Anzola Emilia, Calderara di Reno.

Monitoraggio zanzare AUTOCTONE

SETTIMANA N° 29



SUSTENIA S.r.l.

Via Marzocchi, 16 San Giovanni in Persiceto


Tel. 051.6871051; Email: info@sustenia.it



Prevenzione e lotta alle zanzare nella pianura Bolognese

Comuni di Crevalcore, San Giovanni in P., Sala Bolognese, Anzola Emilia, Calderara di Reno.

Monitoraggio zanzare AUTOCTONE




SCALA DI DISAGIO



● Catture non rilevate

Legenda

- Centri abitati (Orange square)
- aree umide (Blue square)
- Area di progetto: Bologna ovest Reno (Light blue background)



Catture moleste di *Aedes caspius* sono state registrate nelle stazioni di Palata Pepoli e Crevalcore.



SUSTENIA S.r.l.
Via Marzocchi, 16 San Giovanni in Persiceto
Tel. 051.6871051; Email: info@sustenia.it

Il valore di disagio è ottenuto sulla base del numero delle zanzare catturate con le trappole ad anidride carbonica e considerando l'aggressività delle singole specie raggruppate in tre categorie: Gruppo a disagio **alto** (*Aedes caspius*, *Aedes vexans*), **medio** (*Culex modestus*, *Anopheles spp.*), **basso** (*Culex pipiens*; *Culiseta spp.*).

Prevenzione e lotta alle zanzare nella pianura Bolognese


Comuni di Crevalcore, San Giovanni in P., Sala Bolognese, Anzola Emilia, Calderara di Reno.

La presenza molesta di Zanzara Tigre è stata registrata nella stazione di Decima.



Parliamo di Pappataci.....

La stazione di Sala Bolognese ha registrato 130 esemplari di Pappataci. I Pappataci o Flebotomi appartengono all'ordine dei Ditteri, sottordine Mematoceri, famiglia Psychodidae, sottofamiglia Phlebotominae. Sono insetti piccoli, 2-3 mm di media, di colore nocciola chiaro e sono ricoperti da una fitta peluria. Come le zanzare sono insetti ematofagi, ovvero hanno bisogno del pasto di sangue per maturare le uova. Hanno abitudini crepuscolari e notturne. Le femmine attaccano senza far rumore, da qui il nome "Pappa e tace". E le loro punture sono fastidiose. Si contano nel mondo oltre 800 specie di Flebotomi; in Italia sono presenti solo 8 specie di cui 4 vettori della *Leishmaniosi*, malattia provocata da un protozoo, *Leishmania infantum*, che colpisce principalmente il cane e raramente l'uomo. Vettori principali sono le specie: *P. Perniciosus*, *P. Perfiliewi*, e *P. papatasi*. I Phlebotomi sono cattivi volatori: compiono brevi "salti" che gli permettono una dispersione di 100-200 metri, a 2-3 metri dal suolo. In condizioni di vento favorevole posso spostarsi fino a 2 km. Fattori che limitano ulteriormente la loro diffusione sono il vento e le temperature al di sotto dei 20° C. Normalmente si concentrano nei luoghi dove possono nutrirsi e riprodursi. Le larve sviluppano in ambienti umidi sotto la vegetazione morta (foglie e altri residui organici); gli adulti nelle ore di inattività si riparano nei luoghi più disparati: nelle crepe del terreno e dei muri, nelle tane di roditori o altri animali, sotto il fogliame fitto. In casa possono ripararsi nelle cantine, nelle lettiere di cani e gatti, dietro i mobili, e nelle camere da letto sotto i materassi.



INFORMAZIONI SULLA DISINFESTAZIONE

ZANZARA TIGRE

Disinfestazione caditoie pubbliche

Chiuso il 3° turno a San Giovanni in P.to. In corso il 3° turno a Crevalcore (marcatura tombini colore arancione)

ZANZARE AUTOCTONE

Trattamenti larvicidi nei focolai lineari (fossi e canali)

la settimana prossima (25 - 30 luglio)

mercoledì: San Giovanni in Persiceto

venerdì: Crevalcore, Sala Bolognese, Calderara di Reno, Anzola Emilia

SUSTENIA S.r.l.

Via Marzocchi, 16 San Giovanni in Persiceto

Tel. 051.6871051; Email:info@sustenia.it

